

(Appendix (1

Questioner

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

كلية علوم المختبرات الطبية

[illegible]

الاسم

العمر.....

عدد الاولاد.....

هل تتناول بعض الادويه

.....(....).....حمض الفوليك

حد.....(.....).....(.....).....

(.....)الوضع المعيشي.....غنى(.....)متوسط(.....)فقير

هل تعاني من امراض اخرى.....

الملايا

السل الرئوي.....

.....الانميا

.....حمى الضنك

.....البلهارسيا

..... ارتفاع ضغط الدم

البول السكري

(Appendix (2

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

كلية الدراسات العليا

دراسة لنيل الماجستير

إبراء ذمة

الأسم \ الرقم :-----

سوف يتم أخذ عينة من الدم من الوريد بواسطة حَقنة طعن وذلك بعد تعقيم منطقة العينة بواسطة مطهر. جميع الأدوات المستخدمة معقمة ومتعقيم فيها جميع وسائل السلامة المعملية وليس هناك آثار جانبية للعملية . و قد يحدث تورم بسيط في منطقة أخذ العينة وسوف يزول بعد فترة قصيرة . الغرض من أخذ العينة هو البحث العلمي . وسوف يسلم المريض نسخة من نتائج التحليل . وسيتم الإحتفاظ بالنتائج في سرية تامة .

أوافق أنا المذكور أعلاه على أخذ عينة دم لإجراء الدراسة .

الإمضاء :-----

التاريخ :-----



Automated haematology analyzer (Sysmex KX-21N)

Table:Frequency of study group according to age group

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-25	273	60.7	60.7	60.7
	26-36	160	35.6	35.6	96.2
	>36	17	3.8	3.8	100.0
	Total	450	100.0	100.0	

Table:frequency ofstudy group at different trimesters

		trimester			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	first	206	45.8	45.8	45.8
	second	207	46.0	46.0	91.8
	third	37	8.2	8.2	100.0
	Total	450	100.0	100.0	

Table: Frequency of study group according to number of childrens

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	152	33.8	33.8	33.8
	2	131	29.1	29.1	62.9
	3	71	15.8	15.8	78.7
	4	46	10.2	10.2	88.9
	5	32	7.1	7.1	96.0
	6	11	2.4	2.4	98.4
	7	5	1.1	1.1	99.6
	8	2	.4	.4	100.0
	Total	450	100.0	100.0	